

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Seinäjoen keskussairaala
Sisätautien poliklinikka/reuma

17.5.2024

REUMAPOTILAIDEN LÄÄKEHOIDON SEURANTAKOKEET

Lääkkeen nimi	Seurantakokeet
SALAZOPYRIN EN (sulfasalatsiini) 3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein	PVK+T+N, ALAT
AZAMUN, IMUREL (atsatiopriini) 3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein	PVK+T+N, ALAT
TREXAN, METOJECT, METHOTREXATE, EBETREX, NORDIMET, INJEXATE (metotreksaatti) -3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein -6 kk välein	PVK+T+N, ALAT Krea (GFR)
ARAVA (leflunomidi) 3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein	TVK, ALAT (sekä verenpaine seuranta)
MYCOPHENOLATE MOFETIL, CELLCEPT (mykofenolaatti) 3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein	PVK+T+N, ALAT
SANDIMMUN NEORAL (siklosporiini) 3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein	Krea (GFR) sekä verenpaine seuranta
SYKLOFOSFAMID, SENDOXAN (syklofosfamidi) 3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein	PVK+T+N, ALAT, U-KemSeul
B I O L O G I S E T L Ä Ä K K E E T - ENBREL, ERELZI, NEPEXTO, BENEPALI (etanersepti) sc - HUMIRA, AMGEVITA, HULIO, HYRIMOZ, IDACIO, IMRALDI, YUFLYMA, HUKYNDRA(adalimumabi) sc - CIMZIA (sertolitsumabipegoli) sc - SIMPONI (golimumabi) sc - REMSIMA (infiximabi) sc - ORENCIA (abatasepti) sc - ROACTEMRA, TYENNE (tosilitsumabi) sc - KINERET (anakinra) sc - KEVZARA (sarilumabi)sc	1 kk, 3kk lääkkeen aloituksesta, sitten 3-12kk välein PVK+T+N, ALAT, CRP Tosilitsumabi ja Kevzara hoidoissa seurataan myös lipidejä (reumapl ottaa)

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Seinäjoen keskussairaala
Sisätautien poliklinikka/reuma

17.5.2024

<p>Reumapkl:lla annettavat infusoitavat biologiset lääkkeet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REMSIMA, REMICADE, ZESSLY (infliksimabi) - ORENCIA (abatasepti) - ROACTEMRA (tosilitsumabi) - MABTHERA, RIXATHON, RUXIENCE (rituximabi) - BENLYSTA (belimumabi) 	<p>Pelkkä infuusiokäynti: PVK+T+N, ALAT, CRP</p> <p>MabThera- ja Benlysta-hoidoissa seurataan myös IgG-tasoa.</p>
<p>JAK- ESTÄJÄT</p> <ul style="list-style-type: none"> - OLUMIANT (barisitinibi) - XELJANZ (tofasitinibi) - RINVOQ (upadasitinibi) - JYSELECA (filgotinibi) 	<p>TVK, ALAT, CRP</p> <p>3vkon, 6vkon, 12 vkon kuluttua aloituksesta, sitten 3-6kk välein</p> <p>Reumapkl:lla seurataan myös lipidejä</p>
<p>SEURANTAKOKEIDEN RAJA-ARVOT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEUK yli 3,0(jos leuk <3.0, tehtävä erittelylaskenta) - B-NEUTR yli 1,0 - B-LYMF yli 0,75(lymfosyyttien erittelylaskenta jos toistetusti lymf < 0.7 - TROMB yli 100 - Jos ALAT yli 100, lääketauko <p>Jos arvot poikkeavat, lääketauko ja kontrolli 2 vk kuluttua. Jos arvot selvästi poikkeavat, konsultoi lääkäriä. Agranulosyytosisissa ohjaus sairaalahoitoon päivystyksenä.</p>	<p>HUOMIOI LÄHTÖARVOT !</p> <p>Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen turvakokeet yleensä kertaalleen 2-3 viikon kuluttua, sitten entisen kaavan mukaan.</p> <p>Jos rasva-arvot vaativat hoitoa, se toteutetaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa</p>

Reumapoliklinikan verikoepaketit:

Reumarutiinit 1: TVK, CRP, LA, ALAT, KREA, AFOS, PLV

Reumarutiinit 2: TVK, CRP, LA, ALAT, KREA,

Hyödylliset linkit:

www.terveyskyla.fi/reumatalo

Terveysportti: HYVAEP nivelreumapotilaan hoitoketju