

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

13.9.2024

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

OHJEEN KÄYTÖSTÄ

Ohjetta tulee soveltaa hoitoyksikön toiminnan luonteen mukaisesti.

Ohje on ns. pikaohje, josta näkee nopeasti tarvittavat varotoimiin liittyvät toimenpiteet

- tämä ohje ei korvaa infektio- ja mikrobikohtaisia ohjeita
- epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä esihenkilöön ja tarvittaessa hygieniahoitajaan
- lisäohjeita esimerkiksi potilaan huonesijoittelusta voit katsoa ohjeesta Varotoimet ja huonesijoitus infektioissa ja moniresistenttien mikrobin kantajilla sekä Kosketus- tai pisaravarotoimien toteuttaminen usean potilaan huoneessa

Lähihoitotilanne:

- fyysinen kontakti potilaaseen
- potilaan lähiympäristöön (alle 1 m, myös siivouksessa)
- lääkärin tutkimus
- erilaiset hoito- ja terapiatilanteet

Varotoimikortit

- Varotoimikortteja käytetään vuodeosastoilla alla olevan ohjeen mukaan. Varotoimikortit laitetaan esille heti, kun on epäily varotoimien tarpeesta.

HUOM!

- Jos tieto varotoimin hoidettavasta potilaasta saadaan etukäteen, huone tyhjenetään tarpeettomasta tavarasta
- Potilashuoneita ei varusteta ylimääräisellä tavaramäärällä.
- Huoneen loppusiivouksessa poistetaan kontaminoituneet ja avatut hoitotarvikkeet (esim. haavataitokset). Hoitohenkilökunnan toimesta poistetaan kaapeista ne tuotteet/tarvikkeet, joita on käsitelty ja kosketeltu. Avaamattomia pakkauksia ei tarvitse hävittää, ne voidaan pyyhkiä pintadesinfektioaineella
- Tiedotetaan kaikille yhteistyötahoille
- Jos yksikössä on käytössä vetyperoksidikuivasumulaite (Nocospray) tai desinfioiva sumutepatruuna (TECcare CONTROL), loppusiivouksen jälkeen tyhjä huone voidaan käsitellä joko laitteella tai patruunalla. Huoneen voi ottaa käyttöön käsittelyn jälkeen.

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Suojavarotoimet</p> <p>*immuunipuutteiset potilaat</p> <p>Potilashuoneen oveen laitetaan suojavarotoimikortti</p> <p>Akuuttia infektiota sairastavat eivät osallistu potilaan hoitoon tai huoneen siivoukseen</p> <p>Ei leikkokukkia tai ruukkukasveja potilashuoneeseen</p> <p>Kts. lisäohjeita suojavarotoimien toteuttamiseen ohjeesta Suojavarotoimet</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Suojakäsineitä käytetään potilaskosketuksessa</p> <p>Läihoidossa suositellaan käytettävän lisäksi suojaesiliinaa tai -takkia</p> | <p>Siivotaan ensimmäisenä, normaalsiivous, mikrokuitusiivouspyyhkeet, huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Normaali käytäntö</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <p>1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> <p>Viihdytysvälineet:</p> <p>pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Hoitoyksikkösiirroissa avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosketusvarotoimet MRSA MDR-Acin/MDR-Aci (moniresistentti acinetobakteeri) VRE | Huolellinen käsien desinfektio Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa Suu-nenäsuojusta käytetään, kun on vaara roiskeista Huoneen siivouksessa suojakäsineet, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa | Siivotaan viimeisenä , normaali siivous, mikrokuitupyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine Eritetahrat , kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL | Ei tartuntavaarallista , mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol | Normaalialueen yhdyskuntajätettä Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun Avatut hoitotarvikepakkaukset annetaan potilaan mukaan Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen |
| ESBL <i>Escherichia Coli</i> (E. Coli), tavanomaiset varotoimet. Poikkeuksena hematologiset potilaat, joita hoidetaan kosketusvarotoimia noudattaen, jos hoidossa huomioitava riski on voimassa. | | | | |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kosketusvarotoimet</p> <p>ESBL</p> <p>Klebsiella pneumoniae</p> <p>CPE = Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit</p> <p>MDRPA/MDR-Pseu =moniresistentti Pseudomonas aeruginosa</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa ja huoneen siivouksessa käytetään suojakäsineitä ja -esiliinaa tai hihallista esiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista.</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään klooriyhdiste 1000 ppm, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL.</p> <p>Eritetahrat: kaksivaiheinen eritetahradesinfektio.</p> <p>Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin käsienspesualtaan pesun yhteydessä. Kerran viikossa ja loppusiivouksessa tietyt irrotettavat desinfioivan pesukoneen kestävät suihkupäät pestään huuhteludesinfektio-pesukoneessa (tai kemiallinen desinfektio). Katso erillinen ohje taulukon lopussa s.16.</p> <p>Loppusiivous: WC-tilan vesikalusteiden klooraus. Katso erillinen ohje taulukon lopussa s.17–18.</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta pyykki kerätään huoneessa suoraan kankaiseen pyykkipussiin. Tekstiilit pestään vähintään 60 °C.</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol. <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä. Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen osalta otetaan yhteyttä hygieniahoitajaan.</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen.</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kosketusvarotoimet</p> <p>Candida Auris</p> | <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa ja huoneen siivouksessa käytetään suojakäsineitä ja -esiliinaa tai hihallista esiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista.</p> <p>Huoneesta poistuessasi pese kädet vedellä ja saippualla. Desinfioi kädet pesun jälkeen.</p> | <p>Huone siivotaan kahdesti päivässä, kertakäyttöisillä siivouspyyhkeillä sekä huonekohtaisilla siivousvälineillä.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään klooriyhdiste 1000 ppm, Erisan Oxy+ 5 %, tai käyttövalmis TECcare CONTROL.</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio</p> <p>Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin käsienspesualtaan pesun yhteydessä. Kerran viikossa ja loppusiivouksessa tietyt irrotettavat desinfioivan pesukoneen kestävät suihkupäät pestään huuhteludesinfektio-pesukoneessa (tai kemiallinen desinfektio). Katso erillinen ohje taulukon lopussa s.16.</p> <p>Loppusiivous: WC-tilan vesikalusteiden klooraus. Katso erillinen ohje taulukon lopussa s.17-18.</p> | <p>Tartuntavaarallista Pyykki kerätään huoneessa suoraan pesussa liukenevaan muovipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin. Pyykkipussit saa pudottaa pyykkikuiluun. Tekstiilit pestään vähintään 60 °C.</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä. Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun. Jätteet saa pudottaa jätekuiluun.</p> <p>Loppusiivouksen jälkeen informoidaan Infektioiden torjuntayksikköä, joka ottaa pintanäytteet.</p> <p>Huone voidaan ottaa käyttöön, kun näytteet vastattu negatiivisiksi.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen osalta otetaan yhteyttä hygieniahoitajaan.</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosketusvarotoimet Epäily tai todettu <ul style="list-style-type: none"> • Clostridioides Difficile • Norovirus • Rotavirus • Adenovirus Epidemiatilanteessa ohjeita tarkennetaan | Suojaimet puetaan ennen huoneeseen menoa. Kaikki suojaimet riisutaan potilashuoneessa ja laitetaan jätteastiaan Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa, eritteitä poistettaessa suu-nenäsuojusta Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään aina suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa sekä suu-nenäsuojusta, kun vaara roiskeista ja siivottaessa eritteitä Huoneesta poistuttaessa huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla sekä käsien desinfektio | Siivotaan viimeisenä , normaali siivous sekä taso- ja kosketuspintojen desinfektio, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja huonekohtaiset siivousvälineet Huoneen ja wc:n kosketuskohdat desinfioidaan päivittäin: klooriyhdiste 1000 ppm tai Oxivir plus 15 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL. Eritetahrat , kaksivaiheinen eritetahradesinfektio. Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin käsienspesualtaan pesun yhteydessä. Kerran viikossa ja loppusiivouksessa tietyt irrotettavat desinfioidaan pesukoneen kestävä suihkupäät pestään huuhteludesinfektio-pesukoneessa (tai kemiallinen desinfektio). Katso erillinen ohje taulukon lopussa s.16. | Tartuntavaarallista Pyykki ja tekstiiliväliiverhot laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaiseen pyykkipussiin Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % (HUOM! Desiol ei tehoa!) Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 %, (HUOM! Desiol ei tehoa!) | Normaalialueen yhdyskuntajätettä Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka vietään heti suurempaan lajitteluun Kosketusvarotoimet, kunnes potilaan oireiden loppumisesta on kulunut 48 tuntia Desinfioida loppusiivous , kun sairastuneet potilaat ovat poistuneet tai potilaan oireiden loppumisesta on kulunut vähintään 48 tuntia Varotoimien loputtua avatut hoitotarvike- ja suojauspakkaukset hävitetään Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kosketusvarotoimet</p> <p>Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, vyöruusu</p> <p>Pikkulapsilla: hengitystieinfektiot, enterovirusinfektiot</p> <p>Suolistoinfektiot vaippaikäisillä ja inkontinenteilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> EHEC (1 hengen huone muillakin, jos mahdollista) Giardia lamblia Kampylobakteeri Kryptosporidium Salmonella Shigella, Yersinia <p>Märkärupi</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Suu-nenäsuojusta käytetään, kun on vaara roiskeista</p> <p>Huoneen siivouksessa suojakäsineet, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä.</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p><u>Avatut</u> hoitotarvikepakkaukset annetaan potilaan mukaan</p> <p>Kosketusvarotoimet oireiden ajan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pisaravarotoimet</p> <p>Influenssa</p> <p>epäily tai todennettu</p> <p>Varotoimia käytetään 7 vrk oireiden alusta tai 5 vrk viruslääkityksen aloittamisesta</p> <p>Yskimishygienia opastus potilaalle</p> <p>Epidemiatilanteessa ohjeita tarkennetaan</p> <p>Metapneumovirus</p> <p>Parainfluenssa</p> <p>Rinovirus</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Kaikissa tutkimus- ja hoitotilanteissa sekä huoneen- ja potilaspaikan siivouksessa (lähikontakti alle 2 m):</p> <ul style="list-style-type: none"> • suojakäsineet • suu-nenäsuojus • tarvittaessa suojaesiliina tai hihallinen esiliina tai suojatakki <p>Aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä esim. liman imeminen hengitysteistä käytetään FFP3 hengityksensuojainta</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pisaravarotoimet COVID-19 epäily tai todennettu</p> <p>Varotoimet voidaan lopettaa, kun potilas on ollut oireeton 48 h ja oireiden alusta on kulunut 5–14 vrk. Syvästi immuunipuutteisen potilaan varotoimiaika 20vrk.</p> <p>Yskimishygienia opastus potilaalle</p> <p>Epidemiatilanteessa ohjeita tarkennetaan</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Lyhyet käynnit huoneessa Kirurginen suunenä-suojus</p> <p>Pitkäaikaisessa lähihoidossa, ja aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FFP2/ FFP3 hengityksensuojain • suojalasit (sanka + visiiri) tai kokokasvovisiiri • pitkähihainen suojaesiliina tai suojatakki • suojakäsineet <p>Päivittäissiivouksessa käytetään yllä olevia suojaimia.</p> <p>Loppusiivouksessa riittää muiden suojainten lisäksi kirurginen suunenä-suojus.</p> <p>Potilashuoneen siivous kerran päivässä</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet. Lisäksi desinfiioiva puhdistusaine.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnoille Klooria käytettäessä kertakäyttöpyyhe, Oxivir plus ja TECcare + mikrokuitupyhyhe</p> <p>Lattiapinnan pyyhintä: Heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Suihkupäät, letkut ja pidikkeet puhdistetaan päivittäin ja eristyksen päätyttyä (katso ohje lopussa).</p> <p>Siivousvälineet desinfioidaan ylläpitossiivouksessa</p> <p>Loppusiivous: Kosketus- ja tasopinnot TECcare CONTROL, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 %. Lattiapinnat heikosti emäksinen puhdistusaine.</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %</p> <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> <p>Tekstiiliväliiverhot vaihdetaan, kertakäyttöiset väliiverhot huolletaan ohjeen mukaisesti eristyksen loputtua</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pisara- ja kosketusvarotoimet</p> <p>Adenovirus RSV</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Eritteitä poistettaessa käytetään suu-nenäsuojusta</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <p>1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ilmavarotoimet</p> <p>Tartuttava tuberkuloosi</p> <p>Epäily tai todettu</p> <ul style="list-style-type: none"> • keuhko- tai kurkunpäätuberkuloosi, yskösvärjäyspositiivinen • MDR-tuberkuloosi • XDR-tuberkuloosi | <p>Kaikki huoneeseen menevät käyttävät FFP3 -hengityksensuojainta</p> <p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Potilas käyttää kirurgista suunänsuojusta siirtotilanteissa</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 % tai Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ensisijaisesti lämpödesinf. 2. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Eristyksen kesto vaihtelee ja siitä päättää hoitava lääkäri</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan hoitoyksikkösiirroissa</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti loppusiivouksen jälkeen</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pisaravarotoimet</p> <p>Meningiitti Epäily tai todettu</p> <ul style="list-style-type: none"> meningokokki <p>Pisara- ja kosketusvarotoimet</p> <p>Meningiitti</p> <ul style="list-style-type: none"> Haemophilus influenzae <p>Varotoimien kesto 24 tuntia tehokkaan hoidon alusta</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Huoneen, potilaspaikan siivouksessa ja purkamisessa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Kaikissa lähihoitotilanteissa käytetään suojaimia tavanomaisten varotoimien mukaan</p> <p>Eritteitä poistettaessa käytetään suu-nenäsuojusta</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, mikrokuitusiivous-pyyhkeet (jos käytössä) tai kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Ei tartuntavaarallista, mutta kerätään potilashuoneessa pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Jätteet laitetaan suoraan roskapussiin, joka viedään heti suurempaan lajitteluun</p> <p>Avatut hoitotarvikepakkaukset laitetaan potilaan mukaan</p> <p>Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ilma, kosketus- ja pisaravarotoimet</p> <p>Tuhkarokko tartunta/epäily</p> <p>Tartuttavaa: Hengitystie-eritteet</p> <p>Tartuttava aika 4 vrk ennen ihottumaa ja 4 vrk ihottuman jälkeen/oireisen ajan</p> <p>Vierailurajoitukset: raskaana olevat, immuunipuutteiset ja rokottamattomat tartuttavana aikana</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Kaikki potilashuoneeseen menevät käyttävät FFP3 -hengityksensuojainta</p> <p>Lähihoitotilanteissa käytetään hengityksensuojaimen lisäksi suojakäsineitä ja hihallista suojaesiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Huoneen siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin potilaan hoidossa</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous sekä taso- ja kosketuspintojen desinfektio, kertakäyttöiset siivousliinat ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Ei tartuntavaarallista</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet: pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Varmista, että tuhkarokkoepäilystä/tartunnasta on asianmukaisesti tiedotettu.</p> <p>Tarkemmat ohjeet: Päivystyksen toimintaohje tuhkarokko epäilyssä</p> <p>Muuta:</p> <p>Huomioi erillisen tilan tarve potilaan vastaanottoa varten.</p> <p>Potilaalle laitetaan suu-nenäsuojus siirtotilanteessa.</p> <p>Tuhkarokkoepäilyssä näytteet otetaan keskussairaalan päivystyksessä, näytteenottoaika sovitaan etukäteen soittamalla päivystyksen triagehoitajalle</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Infektio / Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ilma-, kosketus- ja pisaravarotoimet</p> <p>Lintuinfluenssa</p> <p>M-rokko</p> <p>Lääkäri määrittelee varotoimien keston</p> | <p>Huolellinen käsien desinfektio</p> <p>Kaikki potilashuoneeseen menevät käyttävät FFP3 -hengityksensuojainta, suojakäsineitä ja hihallista suojaesiliinaa tai suojatakkaa</p> <p>Huoneen siivouksessa käytetään samoja suojaimia kuin potilaan hoidossa</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous sekä taso- ja kosketuspintojen desinfektio, kertakäyttöiset siivousliinat ja huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Tartuntavaarallista</p> <p>Pyykki ja tekstiiliväiverhot laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö:</p> <ol style="list-style-type: none"> ensisijaisesti lämpödesinf. pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol <p>Viihdytysvälineet:</p> <p>pintadesinfektio ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti tai materiaalin vaatimusten mukaan: TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> | <p>Lintuinfluenssassa normaali jätteiden käsittely</p> <p>M-rokossa jätteet tartuntavaarallisia</p> <p>Muuta:</p> <p>Huomioi erillisen tilan tarve potilaan vastaanottoa varten.</p> <p>Potilaalle laitetaan suunäsuojus siirtotilanteessa.</p> |

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio | Jätteet / Muuta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kosketusvarotoimet kunnes ensimmäisen hoitokerran loppumisesta on kulunut 24 tuntia</p> <p>Syyhy, täit, satiainen</p> <p>Karstasyyhyhypotilas hoidetaan yhden hengen huoneessa, kunnes molemmat hoitokerrat on toteutettu ja hoito todettu tehonneeksi</p> <p>Erillinen ohje: Syyhy ja sen tartuntojen leviämisen ehkäisy hoitoyksikössä</p> | <p>Huoneen ja potilaspaikan siivouksessa sekä purkamisessa käytetään suojakäsineitä ja hihallista esiliinaa tai suojatakkia (suojakäsineet vedetään hihansuun päälle)</p> <p>Kaikissa tutkimus- ja hoitotilanteissa käytetään suojakäsineitä ja kertakäyttöistä suojatakkia tai hihallista suojaesiliinaa, kun kosketaan potilaan ihoa, vaatteita ja vuodevaatteita. Paljaat ihonkohdat käsissä suojataan (suojakäsineet vedetään hihansuun päälle).</p> <p>Huoneesta poistuttaessa huolellinen käsien pesu vedellä ja saippualla sekä käsien desinfektio</p> | <p>Siivotaan viimeisenä, normaali siivous, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet sekä huonekohtaiset siivousvälineet</p> <p>Taso-, kosketus- ja lattiapinnat: heikosti emäksinen puhdistusaine</p> <p>Eritetahrat, kaksivaiheinen eritetahradesinfektio: klooriyhdiste 1000 ppm, Oxivir plus 3,5 %, Erisan Oxy+ 2 % tai käyttövalmis TECcare CONTROL</p> | <p>Tartuntavaarallista Pyykki ja tekstiiliväliverhot laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaiseen pyykkipussiin</p> <p>Tutkimus- ja hoitovälineistö: 1. ensisijaisesti lämpödesinf. huuhteludesinfektiokoneessa (esim. Deko) 2. vesipesua kestävämmille pintadesinfektio TECcare CONTROL, Erisan Oxy+ 2 %, Oxivir plus 3,5 % tai Desiol</p> <p>Karstasyyhyssä huoneen kosketuskorkeudella olevat tekstiilit (pitkät ikkunaverhot ja väliverhot) ja tekstiilipintaiset huonekalut pestään huolellisesti</p> | <p>Normaalia yhdyskuntajätettä</p> <p>Vaatteet, pyyhkeet ja vuodevaatteet vaihdetaan ja pestään aina hoitoa seuraavana aamuna</p> <p>Eristyksen purusta tarkemmat ohjeet: pyykki-, vuode- ja muu tekstiilihuolto → kts ohje: Syyhy ja sen tartuntojen leviämisen ehkäisy hoitoyksikössä</p> <p>Eristyksen loputtua eristyshuoneessa avatut hoitotarvike- ja suojainpakkaukset hävitetään</p> <p>Avaamattomat hoitotarvikkeet ym., joita ei voi puhdistaa suljetaan muovipussiin 3 vuorokaudeksi.</p> |

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
 Medisiiniset palvelut
 Infektioiden torjunta

13.9.2024

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

| Varotoimet | Suojautuminen / Käsihygienia | Siivous / Desinfektio | Pyykki / Desinfektio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosketusvarotoimet Luteet Kts. erillinen ohje: Luteiden torjunta | Huolellinen käsien desinfektio Suojakäsineet ja hihallinen esiliina ja suojatakki läihoidossa, likapyykin/vuodetekstiilien käsittelyssä sekä siivouksessa | Siivoustoimet tuholistorjuntayrityksen ohjeen mukaan | Tartuntavaarallista Pyykki laitetaan huoneessa suoraan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen kankaaseen pyykkipussiin. Pussin päälle merkintä "lutikkapyykki". |
| Jos tilassa on tai epäillään olevan lutikoita, torjuntatoimet tulee aloittaa heti. Ota yhteyttä hygieniahoitajaan, joka informoi asiasta kunnan tartuntataudeista vastavan hoitajan. | | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUIHKUPÄIDEN JA -LETKUJEN HUOLTO Toimitaan yksikkökohtaisten ohjeiden mukaan | Suihkuletkujen sisäpinnoille sekä suihkupäihin muodostuu herkästi biofilmiä. <ul style="list-style-type: none"> • Puhdista suihkupäät, letkut ja pidikkeet päivittäissiivouksen yhteydessä. • Pese tietyt irrotettavat desinfioivan pesukoneen kestävät suihkupäät ja -letkut huuhteludesinfektiolaitteessa kerran viikossa sekä tehdessäsi loppusiivousta varotoimihuoneeseen. • Käytä suihkupäiden ja -letkujen pesussa siihen suunniteltua telinettä, jossa vesi pääsee virtaamaan letkujen ja päiden läpi. • Mikäli telinettä ei ole käytössä, upota suihkupää ja letku kauttaaltaan Erisan Oxy+ 2 % liuokseen 30 min ajaksi tai TECcare CONTROL käyttöliuokseen (laimennos tiivisteestä 12 ml / litra vettä) vähintään 5min. ajan. • Harjaa suihkupään ja letkun ulkoiset pinnat liotuksen aikana. • Lopuksi huuhtele suihkupää ja letku runsaalla vedellä. • Poikkeus Candida Auris: Erisan Oxy+ 5 % liuos 15min. tai TECcare CONTROL käyttöliuos (laimennos tiivisteestä 12 ml / litra vettä) vähintään 5min. ajan. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

13.9.2024

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

WC-TILAN VESIKALUSTEIDEN KLOORAUS (ESBL Klebsiella pneumoniae, MDRPA, CPE, Candida auris)

Klooraus suoritetaan WC- ja kylpytilassa, mikäli potilas on ollut osastolla yön yli ja WC-tilaa on käytetty. Potilashuoneen tai sulkutilan käsiällasta ei ole tarpeen kloorata.

Suojaimet:

- nestettä läpäisemätön hihallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kumisaappaat
- hengityksensuojain FFP2
- silmäsuojain (suojalasit tai visiiri)
- nitrilisuojakäsineet (EN374)
- vaihda käsineet, jos niihin tulee roiskeita
- riisu käsineet välittömästi työskentelyn jälkeen

Tarvittavat välineet:

- Metallipöytä
- Vuodesuoja ("kroonikkovaippa") metallipöydän suojaksi
- Laimentamaton kloori
- Mittakannu
- Kieltokyltti/ SEIS-tarra wc:n oveen

Toimintaohje:

1. Pue suojaimet.
2. Kaada rauhallisiin liikkein klooria erilliseen mittakannuun suojatun metallipöydän päällä.
3. Valuta laimentamaton kloori hitaasti WC-tilan vesikalusteiden sisäosiin
 - WC-istuin: 4 dl yläreunoja pitkin
 - Lattiakaivo 2 dl yläreunoja pitkin
 - Käsiällä 1,5 dl - kaada kloori suoraan viemäriin, varo roiskeita altaan pohjalle (pyyhi mahdolliset roiskeet runsaalla vedellä kostutetulla paperilla, vaihda suojakäsineet)
4. Sulje WC-tilan ovi huolellisesti ja laita oveen kieltokyltti/tarra.
5. Anna kloorin vaikuttaa 60min. Älä valuta WC-tilan hanoista vettä ennen vaikutusajan loppumista.
6. Riisu suojaimet.
7. Pura aputaso ja pyyhi pinnat.

jatkuu seuraavalla sivulla

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

13.9.2024

VAROTOIMIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

WC-tilan loppusiivous kloorauksen jälkeen:

1. Pue suojaimet. FFP2-hengityksensuojainta käytetään wc-tilan siivouksen ajan.
2. Vaihda ensimmäisenä puhtaat suihkuletkut ja -päät.
3. Harjaa wc-istuin ja lattiakaivon sisäosat omilla harjoillaan, aiemmin valutettu kloori riittää desinfektioaineeksi. Varo roiskeita.
4. Riisu suojakäsineet, desinfioi kädet ja pue uudet suojakäsineet.
5. Huuhtelee käsiallas, wc-istuin ja lattiakaivo rauhallisesti käsisuihkulla. Varo roiskeita.
6. Tee tämän jälkeen wc- ja suihkutilan loppusiivous ohjeiden mukaisesti. Voit käyttää siivouksessa Erisan Oxy + 2 %:sta tai TECcare CONTROL käyttövalmista liuosta.
 - Käsialtaan pohja harjataan Erisan Oxy+ 2 %:lla desinfektioaineella tai TECcare CONTROL käyttövalmiilla liuoksella.
 - Wc-istuimen sisäosan sekä lattiakaivon harjausta ei tarvitse toistaa.