

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

9.10.2024

SOTE-työntekijöiden poissaolo-ohjeet hengitystie- ja mahasuolikanavan infektioissa

Infektioiden leviämisen torjunnassa hyvä käsihygienia ja oikeaoppiset yskimisen tavat ovat keskeisiä.

Hengitystieinfektiot

Akuutti hengitystieinfektio, "flunssa", taudinaiheuttajana eri viruksia mukaan lukien influenssa ja koronavirus.

- Työntekijä jää pois oireiden alettua.
- Töihin voi palata, kun kuume on poissa ja oireet ovat väistymässä.
- Jos töihin palatessa on vielä lieviä oireita, työntekijä käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, kunnes oireet ovat väistyneet.
- Mikäli työntekijä ei ole työkykyinen, hän sairastaa kotona voimassa olevien sairauspoissaolokäytänteiden mukaisesti.

Oksennus/ripulitauti

- Työntekijä jää pois oireiden alettua.
- Töihin voi palata, kun oireet ovat olleet poissa vähintään yhden vuorokauden.
- Jos tiedetään, että kyse on noroviruksesta, suositellaan poissaoloa kaksi vuorokautta oireiden päättymisestä.